

معرفی فضای \mathbb{R}^3

با صفحه و دستگاه مختصات دو بعدی آشنایی داریم و می‌دانیم هر نقطه از صفحه دقیقاً توسط یک زوج مرتب مانند (a, b) که $a, b \in \mathbb{R}$ مشخص می‌شود و هر زوج مرتب دقیقاً یک نقطه را مشخص می‌کند. با توجه به اینکه هر نقطه از صفحه را به صورت زوج مرتب (x, y) نمایش می‌دهند در این صورت مجموعه $\{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ شامل همه نقاط صفحه می‌باشد و آن را با \mathbb{R}^2 نمایش می‌دهند، یعنی

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$$

همچنین با معادله خط در صفحه آشنایی دارید و می‌دانید که حالت کلی آن به صورت $ax + by = c$ است که در آن $a, b, c \in \mathbb{R}$ و a و b هم‌زمان صفر نیستند.




به طور کلی هر وقت گفته می‌شود رابطه یا معادله‌ای نمودار G را مشخص می‌کند یعنی مختصات هر نقطه از نمودار G در آن رابطه یا معادله صدق می‌کند و برعکس هر نقطه که مختصات آن در رابطه یا معادله مذکور صدق کند روی نمودار G قرار دارد.

با توجه به آنچه گفته شد می‌خواهیم در \mathbb{R}^2 یا همان صفحه، با داشتن برخی روابط شکل‌های متناظر با آنها را و یا برعکس با داشتن برخی شکل‌ها، روابط مرتبط با آنها را


مشخص نماییم.

کاردرکلاس


۱- برای هر یک از روابط زیر ابتدا چند نقطه از صفحه که در آن رابطه صدق می‌کند را مشخص کنید و سپس شکل کلی مربوط به آن رابطه را تعیین نمایید.




ج) $y = x^2, 1 \leq x \leq 2$




ث) $y = x^2, -1 < x \leq 2$




ت) $x = 1, -1 \leq y < 3$






خ) $y \geq x^2$





ح) $x^2 < y \leq 2$



ج) $-2 \leq y \leq 1, -1 \leq x \leq 1$



۲- در هر یک از شکل های روبه رو ابتدا مختصات چند نقطه از آن شکل را مشخص نمایید و سپس با توجه به ویژگی های مشترک نقاط مشخص شده و ویژگی های دیگری که از شکل دریافت می کنید رابطه مربوط به آن شکل را بنویسید.^۱



۱- صرفاً ناحیه هایی مدنظر است که مرزهای آنها خطوط موازی محورهای مختصات باشد.



حال به سراغ فضای \mathbb{R}^3 می‌رویم. ابتدا با مختصات یک تناظر بین مجموعه نقاط فضای \mathbb{R}^3 و مجموعه تمام سه‌تایی‌های (a,b,c) که در آن $a,b,c \in \mathbb{R}$ برقرار می‌نماییم و سپس ارتباط بین برخی معادلات (یا روابط) و شکل‌های مربوط به آنها را بررسی خواهیم کرد. باید توجه داشته باشیم از آنجا که ما دستگاه مختصات سه بعدی را در صفحه که خود دو بعدی است رسم می‌کنیم لذا در این حالت برای تصویر بسته شکل‌ها باید از قدرت تجسم خود کمک بگیریم.

معرفی فضای \mathbb{R}^3

مشابه \mathbb{R}^2 می‌توان مجموعه تمام سه‌تایی‌های مرتب (x,y,z) که در آنها x,y,z اعداد حقیقی‌اند را به صورت زیر در نظر گرفت که به آن فضای \mathbb{R}^3 می‌گویند.

$$\mathbb{R}^3 = \{(x,y,z) | x,y,z \in \mathbb{R}\}$$





به یاد می‌آوریم که برای نمایش نقاط \mathbb{R}^2 از یک دستگاه مختصات متشکل از دو محور عمود برهم x و y استفاده می‌شود. به طور مشابه می‌توان فضای \mathbb{R}^3 را نیز با استفاده از یک دستگاه مختصات متشکل از سه محور عمود برهم که در نقطه‌ای مانند O متقاطع‌اند نمایش داد. این محل تقاطع، مبدأ مختصات دستگاه می‌باشد و فاصله در امتداد هر سه محور با یک واحد طول سنجیده می‌شود. وضعیت سه محور دو به دو عمود برهم شبیه به فصل مشترک دو دیوار و کف یک اتاق می‌باشد که در شکل دیده می‌شود و در واقع تشکیل یک کعبه می‌دهند.

محورهای Ox ، Oy و Oz به ترتیب محور x ‌ها، محور y ‌ها و محور z ‌ها نامیده می‌شوند. محورهای فوق تشکیل دهنده سه صفحه می‌باشند. صفحات مختصات عبارت‌اند از صفحه xy (کف اتاق) شامل محور x و y ‌ها، صفحه yz (دیوار سمت راست) شامل محور y ‌ها و z ‌ها، صفحه xz (دیوار سمت چپ) شامل محور x و z ‌ها هستند. جهت مثبت هر یک از محورها با پیکان مشخص شده است. اگر محورها را از مبدأ مختصات (نقطه O) در خلاف جهت ادامه دهیم تا مقادیر منفی برای محورها ظاهر شوند آنگاه این دستگاه \mathbb{R}^3 به هشت ناحیه که چهار ناحیه آن بالای صفحه xy و چهار ناحیه دیگر زیر صفحه xy هستند تقسیم می‌شود. چهار ناحیه بالای صفحه xy مطابق با شماره گذاری استاندارد یک دستگاه \mathbb{R}^2 شماره گذاری می‌شوند.


شماره ناحیه	علامت محورها		
	x	y	z
۱	+	+	+
۲	-	+	+
۳	-	-	+
۴	+	-	+
۵	+	+	-
۶	-	+	-
۷	-	-	-
۸	+	-	-

مثلاً ناحیه‌ای که در آن مقادیر روی هر سه محور مثبت هستند ناحیه شماره ۱ می‌باشد. به طریق مشابه چهار ناحیه پایین صفحه xy از ۵ تا ۸ شماره گذاری می‌شوند. شماره هر ناحیه و وضعیت محورها در شکل‌ها و جدول روبه‌رو مشخص شده‌اند.

۱- از برخورد سه صفحه دوه‌دو متقاطع، یک کعبه تشکیل می‌شود.




برای نمایش سه تایی مرتب (x, y, z) در دستگاه مختصات \mathbb{R}^3 کافی است ابتدا همانند شکل ۱ نقطه $(x, y, 0)$ را در صفحه xy بیابیم و سپس ارتفاع آن را به اندازه z در راستای موازی با محور z ها (یعنی به طور عمودی) تغییر دهیم تا شکل شماره ۲ حاصل شود.



محورستان


در واقع، می توان سه نقطه به طول های x, y, z به ترتیب بر روی محورهای x, y, z در نظر گرفت و سپس صفحه گذرنده از x و موازی با صفحه yz ، صفحه گذرنده از y و موازی با صفحه xz و صفحه گذرنده از z و موازی با صفحه xy را در نظر بگیریم. محل تقاطع این سه صفحه یک نقطه به طول x ، عرض y و ارتفاع z است که نمایش دهنده سه تایی مرتب (x, y, z) می باشد. مثلاً نقطه P در شکل زیر متناظر با سه تایی مرتب $(2, 4, 1)$ است.



نقطه

همچنین نقطه O که مبدأ مختصات است متناظر سه تایی مرتب $(0, 0, 0)$ می باشد.
 دو نقطه $P = (x, y, z)$ و $Q = (x_1, y_1, z_1)$ را برهم منطبق گوئیم و می نویسیم $P = Q$
 هرگاه مختصات آنها نظیر به نظیر مساوی باشند یعنی $x = x_1, y = y_1, z = z_1$.

برای یافتن فاصله یک نقطه از \mathbb{R}^3 مانند $P = (x, y, z)$ از مبدأ مختصات کافی است از نقطه P عمودی بر صفحه xy رسم کرده و پای عمود را P' بنامیم. در این صورت با توجه به شکل مقابل از قضیه فیثاغورس طول پاره خط OP' به صورت زیر محاسبه می شود.




$$|OP'| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

اکنون در مثلث قائم الزاویه OPP' از قضیه فیثاغورس برای محاسبه طول وتر OP استفاده می کنیم. پس داریم:

$$|OP| = \sqrt{|OP'|^2 + z^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

رابطه فوق را می توان با توجه به شکل برای فاصله دو نقطه دلخواه از \mathbb{R}^3 مانند $P = (x, y, z)$ و $Q = (x_1, y_1, z_1)$ به صورت زیر تعمیم داد.


$$|PQ| = \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2}$$




مثال: در این شکل اتاقی به طول ۵ متر و عرض ۴ متر و ارتفاع ۳ متر مشاهده می شود. طول قطر این اتاق از یک گوشه آن به گوشه مقابلش چقدر است؟

$$\text{قطر اتاق} = \sqrt{4^2 + 5^2} = \sqrt{41} \Rightarrow \text{قطر مستطیل کف اتاق} = \sqrt{4^2 + 5^2} = \sqrt{41}$$

حال که با دستگاه مختصات سه بعدی آشنا شدیم با داشتن برخی معادلات یا روابط به بررسی نمودارهای مربوط به آنها و یا برعکس، با داشتن برخی نمودارها به بررسی رابطه یا معادله مربوط به آنها می پردازیم.




مثال: فرض کنید معادله $x = 0$ داده شده باشد و ما بخواهیم شکل یا نمودار مربوط به آن را مشخص کنیم. با توجه به آنچه گفته شد باید تمام نقاطی را مشخص کنیم که در این معادله صدق می کنند و این یعنی تمام نقاطی که مؤلفه اول آنها یعنی x برابر صفر باشد. همواره با داشتن چنین معادلاتی باید دقت کنید که فضای مورد نظر در مسئله \mathbb{R}^2 است یا \mathbb{R}^3 .



قبلاً در کار کلاس دیدیم که شکل مربوط به این معادله در \mathbb{R}^2 محور y هاست. حال می‌خواهیم تمام نقاطی از \mathbb{R}^3 را مشخص نماییم که مؤلفه اول آنها برابر صفر است، یعنی تمام سه تایی‌هایی به صورت $(0, y, z)$ به طوری که $y, z \in \mathbb{R}$. همان‌گونه که دیده می‌شود مقدار y و z هر چه باشد در صورتی که مؤلفه اول صفر باشد آن نقطه در معادله مذکور صدق می‌کند و به عبارتی برای یافتن نقاطی که در معادله $x=0$ صدق می‌کنند در انتخاب مقادیر y و z آزاد هستیم. مثلاً نقاط $(0, -3, -1)$, $(0, 0, 0)$, $(0, 1, 2)$ و $(0, -1, 5)$ همگی در معادله صدق می‌کنند. تمام این نقاط در معادله $x=0$ صدق می‌کنند و این همان صفحه yz است.

چهار دستگانه



۱ فعالیت

در مثال قبل دیدیم که نمودار مربوط به معادله $x=0$ در \mathbb{R}^3 تمام نقاط صفحه yz است (به عبارتی $x=0$ معادله صفحه yz است) و دیدیم که نقاط مختلفی با y و z های دلخواه (مؤلفه‌های دوم و سوم دلخواه) وجود دارند که در این معادله صدق می‌کنند. حال اگر در بین تمام نقاط صفحه yz به دنبال نقاطی باشیم که مؤلفه سوم آنها نیز برابر صفر باشد؛ یعنی علاوه بر $x=0$ شرط $z=0$ را نیز داشته باشیم چه شکلی خواهیم داشت؟ (با در نظر گرفتن صفحه yz سعی کنید نقاطی از این صفحه را تصور کنید که برای آنها $z=0$ باشد).

۱- مختصات چند نقطه را که در رابطه $\begin{cases} x=0 \\ z=0 \end{cases}$ صدق کنند را مشخص کنید و مکان آنها را در دستگاه مختصات تعیین نمایید.

۲- نمودار مربوط به معادلات $\begin{cases} x=0 \\ z=0 \end{cases}$ چه شکلی است و چه ارتباطی با نمودار

معادله $x=0$ دارد؟ نمودار $x=z=0$ خط راستی است که بر محور y ها منطبق است. اما نمودار $x=0$ صفحه yz است.

می‌دانیم محور y ها در صفحه yz است. پس نمودار $x=z=0$ در صفحه $x=0$ قرار دارد.



مثال: روی صفحه $z=1$ نقاط $A=(1, 2, 1)$ و $B=(2, 2, 1)$ و $C=(3, 2, 1)$ را در نظر می‌گیریم، مؤلفه دوم هر سه نقطه برابر ۲ است. اگر روی صفحه مزبور $(z=1)$ تمام نقاطی که مؤلفه دوم آنها ۲ است را در نظر بگیریم یک خط تشکیل می‌دهند (نمودار آن

$$\begin{cases} y=2 \\ z=1 \end{cases}$$

یک خط است به معادلات

کاردرکلاس

۱- در دستگاه مختصات صفحه بعد شکل و معادله چند صفحه مشخص شده است. برای هر کدام از صفحات دو نقطه را مشخص کنید که در آن صفحه قرار دارند.



۲- وجه‌های مکعب مستطیل مشخص شده در شکل قسمت‌هایی از صفحات به معادلات $x=1$, $x=3$, $y=1$, $y=4$, $z=-2$ و $z=2$ هستند^۱.

(الف) در هر یک از شش وجه، مختصات نقطه‌ای را مشخص کنید که بر هیچ وجه دیگری قرار نداشته باشد.

(ب) مختصات سه نقطه را مشخص کنید که دقیقاً بر دو تا از وجه‌ها قرار دارند.

(پ) معادلات مربوط به هر یک از یال‌های این مکعب مستطیل را بنویسید. (دقت کنید که یال‌ها پاره خط‌اند و نه خط)

(ت) مختصات رأس‌های این مکعب مستطیل را بنویسید.



(ث) روابط مشخص‌کننده یکی از وجه‌های مکعب را نوشته‌ایم. روابط مشخص‌کننده پنج وجه دیگر را شما مشخص کنید.

$$\begin{cases} 1 \leq x \leq 3 \\ 1 \leq y \leq 4 \\ z = 2 \end{cases}$$

(ج) مختصات نقطه‌ای را مشخص کنید که درون مکعب باشد و سپس مختصات نقطه‌ای را بیابید که روی یکی از وجه‌های آن و غیر واقع بر یال‌ها باشد.

(چ) شرط اینکه نقطه‌ای درون این مکعب یا روی یکی از وجه‌های آن باشد چیست؟

(ح) روابطی را بنویسید که مشخص‌کننده حجم محدود شده به درون و روی سطح مکعب داده شده باشند.





۱- طرح چنین سؤال‌هایی تنها برای سطوحی که هر مرز آن موازی با یکی از محورهای مختصات است و حجم‌هایی که هر وجه آنها موازی با یکی از صفحات دستگاه مختصات است، مجاز می‌باشد.

$$P_1 : y = 3 \Rightarrow (1, 3, 2) \in P_1, (0, 3, -2) \in P_1$$

$$P_2 : y = 1 \Rightarrow (4, 1, -2) \in P_2, (5, 1, -3) \in P_2$$

$$P_3 : y = -3 \Rightarrow (0, -3, 0) \in P_3, (4, -3, 3) \in P_3$$



$$Q_1 : z = 3 \Rightarrow (1, -1, 3) \in Q_1, (3, 3, 3) \in Q_1$$


$$Q_2 : z = 1 \Rightarrow (4, 0, 1) \in Q_2, (5, -2, 1) \in Q_2$$

$$Q_3 : z = -3 \Rightarrow (2, 3, -3) \in Q_3, (1, 2, -3) \in Q_3$$

$$R_1 : x = 3 \Rightarrow (3, -1, 2) \in R_1, (3, 3, 3) \in R_1$$

$$R_2 : x = 1 \Rightarrow (1, 0, 4) \in R_2, (1, -2, 1) \in R_2$$


$$R_3 : x = -3 \Rightarrow (-3, 0, 2) \in R_3, (-3, 2, 4) \in R_3$$



$$P_1 : x = 1 \Rightarrow (1, 2, 1) \in P_1, P_2 : x = 3 \Rightarrow (3, 2, 1) \in P_2$$

$$P_3 : y = 1 \Rightarrow (2, 1, 1) \in P_3, P_4 : y = 4 \Rightarrow (2, 4, 1) \in P_4$$

$$P_5 : z = -2 \Rightarrow (2, 3, 2) \in P_5, P_6 : z = 2 \Rightarrow (2, 2, 2) \in P_6$$



$$P_1 : x = 1, P_3 : y = 1 \Rightarrow (1, 2, 1)$$

$$P_1 : x = 1, P_4 : y = 4 \Rightarrow (1, 4, 1)$$

$$P_2 : x = 3, P_5 : z = -2 \Rightarrow (3, 3, 2)$$

۶۸

پ:

$$\begin{aligned}
 &AB: x = y = 1; z \in [-2, 2] \quad CD: x = 1, y = 4; z \in [-2, 2] \quad , EF: x = 3, y = 1; z \in [-2, 2] \quad , GH: x = 3, y = 4; z \in [-2, 2] \\
 &AC: x = 1, z = 2; y \in [1, 4] \quad , BD: x = 1, z = -2; y \in [1, 4] \quad , FG: x = 3, z = -2; y \in [1, 4] \quad , EH: x = 3, z = 2; y \in [1, 4] \\
 &AE: y = 1, z = 2; x \in [1, 3] \quad , BF: y = 1, z = -2; x \in [1, 3] \quad , DG: y = 4, z = -2; x \in [1, 3] \quad , CH: y = 4, z = 2; x \in [1, 3]
 \end{aligned}$$

ت:

$$\begin{aligned}
 &A(1, 1, 2) \quad B(1, 1, -2) \quad C(1, 4, 2) \quad , \quad D(1, 4, -2) \\
 &E(3, 1, 2) \quad F(3, 1, -2) \quad G(3, 4, 2) \quad , \quad H(3, 4, -2)
 \end{aligned}$$

ث:

$$\begin{aligned}
 P_1: x = 1; y \in [1, 4], z \in [-2, 2] & \quad P_2: x = 3; y \in [1, 4], z \in [-2, 2] \\
 P_3: y = 1; x \in [1, 3], z \in [-2, 2] & \quad P_4: y = 4; x \in [1, 3], z \in [-2, 2] \\
 P_5: z = -2; x \in [1, 3], y \in [1, 4] & \quad P_6: z = 2; x \in [1, 3], y \in [1, 4]
 \end{aligned}$$


ج: نقطه $M(2, 2, 0)$ درون مکعب و نقطه $N(1, 2, 0)$ روی وجه P_1 قرار دارد.

ج: شرط آنکه نقطه ی M درون مکعب باشد این است که در هر سه شرط $2 < x_M < 3, 1 < y_M < 4, -2 < z_M < 2$ صدق کند.

و شرط آنکه نقطه ی M روی مکعب باشد این است که در یکی از شرایط بند (ث) این سوال صدق کند.

بردارها در \mathbb{R}^2

در سال‌های گذشته با بردارها در صفحه آشنا شدید. هر پاره خط جهت‌دار مانند AB در شکل مقابل، یک بردار را مشخص می‌کند که ابتدای آن A و انتهای آن B می‌باشد. این بردار را با \vec{AB} و اندازه آن را با $|\vec{AB}|$ نشان می‌دهند. اغلب جهت سهولت، بردارها را با حروف کوچک لاتین مانند \vec{a} و اندازه طول آن را با $|\vec{a}|$ نمایش می‌دهند. در شکل زیر چند بردار مختلف رسم شده‌اند. در این کتاب از هر دو شیوه نگارش، بسته به زمینه مورد بحث استفاده می‌گردد.





دو بردار را مساوی یا همسنگ گوئیم هرگاه اندازه و جهت آنها یکسان باشند. با توجه به این تعریف لزومی ندارد که دو بردار مساوی از یک نقطه شروع شده باشند. در شکل مقابل بردارها با هم مساوی هستند. همواره می‌توان هر بردار را با برداری مساوی آن، که از مبدأ مختصات شروع می‌شود یکی دانست، چرا که جهت و اندازه آنها برابر است.

واضح است که می‌توان بی‌شمار بردار دیگر که مساوی هستند را در صفحه در نظر گرفت. به این بردارهای برابر، در اصطلاح، بردارهای هم‌ارز گفته می‌شود. برای سهولت معمولاً برداری که ابتدای آن مبدأ مختصات باشد را به عنوان نماینده بردارهای همسنگ در نظر می‌گیرند. مثلاً در شکل قبل بردار قرمز رنگ نماینده همه بردارهای همسنگ \vec{a} می‌باشد. به همین جهت معمولاً ابتدای بردارها را مبدأ مختصات در نظر می‌گیرند.

با توجه به اینکه ابتدای بردارها را مبدأ مختصات در نظر گرفته‌ایم، مؤلفه‌های یک بردار با مختصات نقطه انتهایی آن برابر می‌شود. بنابراین هر نقطه از صفحه متناظر با یک بردار است و برعکس. از این رو هر بردار مانند \vec{a} را با زوج مرتبی که انتهای بردار را مشخص می‌کند نمایش می‌دهند. یعنی $\vec{a} = (a_1, a_2)$ که (a_1, a_2) مختصات انتهای بردار \vec{a} می‌باشد.

مثال: بردارهای $\vec{a} = (2, 2)$, $\vec{b} = (-2, -2)$ و $\vec{c} = (2, -1)$ و $\vec{d} = (-3, 2)$ و $\vec{i} = (1, 0)$ و $\vec{j} = (0, 1)$ در دستگاه مختصات رویه‌رو رسم شده‌اند.



از سال‌های قبل به یاد می‌آوریم که جمع دو بردار \vec{a} و \vec{b} از روش متوازی‌الاضلاع به صورت زیر به دست می‌آید و به آن برابند دو بردار \vec{a} و \vec{b} می‌گویند.

و نیز اگر داشته باشیم $\vec{a} = (a_1, a_2)$ و $\vec{b} = (b_1, b_2)$ می‌توان نوشت:


$$\vec{a} + \vec{b} = (a_1, a_2) + (b_1, b_2) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2)$$



همچنین اگر $r \in \mathbb{R}$ و \vec{a} یک بردار باشد، آنگاه بردار $r\vec{a}$ به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$r\vec{a} = r(a_1, a_2) = (ra_1, ra_2)$$

می‌توان نشان داد دو بردار \vec{a} و $r\vec{a}$ همواره با هم موازی‌اند و برعکس اگر دو بردار مانند \vec{a} و \vec{b} موازی باشند، آنگاه یکی از آنها مضرب دیگری است. در شکل‌های زیر وضعیت دو بردار \vec{a} و $r\vec{a}$ در حالت‌های مختلف نشان داده شده‌اند.



به‌طور خاص وقتی $r = -1$ بردار $r\vec{a} = (-a_1, -a_2)$ حاصل می‌شود که آن را قرینه بردار \vec{a} می‌نامند. با توجه به تعریف قرینه یک بردار می‌توان برای تفاضل دو بردار نوشت:

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b}) = (a_1, a_2) + (-b_1, -b_2) = (a_1 - b_1, a_2 - b_2)$$

به نظر شما تعبیر هندسی تفاضل دو بردار به کمک جمع بردارها چگونه است؟


معمولاً مبدأ مختصات را به‌عنوان بردار صفر در نظر می‌گیرند و با $\vec{O} = (0, 0)$ نمایش می‌دهند. با توجه به اینکه ابتدای هر بردار مانند $\vec{a} = (a_1, a_2)$ را می‌توان مبدأ مختصات در نظر گرفت، با استفاده از رابطه فاصله دو نقطه از صفحه، اندازه (طول) بردار \vec{a} به صورت زیر به دست می‌آید.

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$

بردارها، کاربردهای فراوانی در محاسبات مهندسی و نیز مدل‌سازی‌ها دارند. به‌طور نمونه بنا به گزارشات هوانوردی، بیشترین سوانح هوایی هنگام برخاستن و فرود هواپیماها رخ می‌دهد. یکی از سخت‌ترین شرایط فرود هنگامی است که باد شدید در جهتی اریب (غیر هم راستا) با خط فرود (مسیر باند فرود) می‌وزد. در این شرایط خلبان می‌بایست هواپیما را در جهتی قرار دهد که برآیند نیروی محرکه هواپیما و نیروی باد در مسیر خط فرود قرار



گیرد (به شکل زیر رجوع کنید). به این نوع نشستن هواپیما، فرود خرچنگی می‌گویند. بردارها برای مدل‌سازی وضعیت فرود هواپیما در چنین شرایطی بسیار مناسب می‌باشند. اکنون به مثال بعد در این رابطه دقت کنید.



مثال: فرض کنید مسیر فرود (خط فرود) در جهت بردار \vec{t} و حداکثر نیروی قابل کنترل در لحظه فرود با اندازه این بردار برابر باشد. همچنین باد نیرویی در جهت بردار \vec{w} به هواپیما وارد می‌کند. در هریک از دو وضعیت زیر خلبان، هواپیما را در هنگام فرود در جهت کدام بردارهای داده شده می‌تواند قرار دهد، به طوری که یک فرود ایمن داشته باشد یعنی برآیند نیروی محرکه \vec{t} و نیز \vec{w} در جهت \vec{t} باشد.

الف	الف-۱	الف-۲	الف-۳
ب	ب-۱	ب-۲	ب-۳

پاسخ: در مورد وضعیت الف براین بردارهای \vec{w} (نیروی باد) و \vec{t} (نیروی محرکه هواپیما) به صورت زیر است.


الف ۱-	الف ۲-	الف ۳-
<p>بردار بر ایند در جهت \vec{t} نیست و هواپیما از باند فرود خارج می شود (خروج از بالای باند)</p>	<p>بردار بر ایند در جهت \vec{t} نیست و هواپیما از باند فرود خارج می شود (خروج از پایین باند)</p>	<p>بردار بر ایند در جهت \vec{t} است و اندازه آن کمتر از \vec{t} است. بنابراین \vec{t} فرود ایمن است.</p>


در مورد وضعیت ب براین بردارهای \vec{w} (نیروی باد) و \vec{t} (نیروی محرکه هواپیما) به صورت زیر است.

ب ۱-	ب ۲-	ب ۳-
<p>بردار بر ایند در جهت \vec{t} است و اندازه آن کمتر از \vec{t} است. بنابراین فرود ایمن است.</p>	<p>بردار بر ایند در جهت \vec{t} نیست و هواپیما از باند فرود خارج می شود (خروج از پایین باند)</p>	<p>بردار بر ایند در جهت \vec{t} نیست و هواپیما از باند فرود خارج می شود (خروج از پایین باند)</p>

معمولاً بردار به طول واحد در جهت محور x ها را با \vec{i} و بردار به طول واحد در جهت مثبت محور y ها را با \vec{j} نمایش می دهند. در شکل مقابل بردار $\vec{i} = (1, 0)$ و $\vec{j} = (0, 1)$ و نیز بردار $\vec{b} = (2, 3)$ به صورت حاصل جمع مضاربی از \vec{i} ، \vec{j} نمایش داده شده اند. به طور کلی می توان هر بردار دلخواه مانند $\vec{a} = (a_1, a_2)$ را به صورت زیر نمایش داد.

$$\vec{a} = (a_1, a_2) = a_1(1, 0) + a_2(0, 1) = a_1\vec{i} + a_2\vec{j}$$






پاسخ در صفحه ی بعد

جوهر سنگان

- ۱- در این دستگاه مختصات چند بردار داده شده است.
- الف) مختصات بردار $\vec{a} + \vec{b}$ را یافته و آن را رسم کنید.
- ب) قرینه بردارهای \vec{c} و \vec{b} را رسم کرده و مختصات آنها را به دست آورید.
- ج) مؤلفه های بردارهای $\vec{a} - \vec{b}$ و $\vec{d} - \vec{c}$ را یافته، آنها را رسم کنید و اندازه هر یک را به دست آورید.
- د) هر یک از بردارهای $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}, \vec{a} + \vec{b}, \vec{a} - \vec{b}, \vec{d} - \vec{c}$ را برحسب بردارهای واحد \vec{i}, \vec{j} به دست آورید.

■ بردارها در \mathbb{R}^3

مشابه بردارهای \mathbb{R}^2 می توان به هر نقطه از \mathbb{R}^3 ، برداری که از مبدأ شروع می شود نظیر کرد. مثلاً فرض کنید $A = (a_1, a_2, a_3)$ نقطه ای غیر از مبدأ \mathbb{R}^3 باشد. در این صورت پاره خط جهت داری که از مبدأ مختصات یعنی $O = (0, 0, 0)$ شروع شده و در نقطه A پایان می یابد یک بردار در \mathbb{R}^3 را مشخص می کند و آن را با $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ نشان می دهیم. در بردار \vec{a} مقادیر a_1, a_2, a_3 را مؤلفه های بردار \vec{a} می گویند. همچنین قرارداد می کنیم که مبدأ مختصات یعنی $O = (0, 0, 0)$ نمایشگر بردار $\vec{0} = (0, 0, 0)$ است که بردار صفر نامیده می شود. به عنوان مثال در شکل مقابل، چند بردار در \mathbb{R}^3 نمایش داده شده است.



■ طول بردار در \mathbb{R}^3


با توجه به رابطه فاصله دو نقطه از \mathbb{R}^3 ، طول هر بردار مانند $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ در \mathbb{R}^3 از رابطه زیر به دست می آید.

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

■ حاصل جمع دو بردار در \mathbb{R}^3

حاصل جمع دو بردار $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ و $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ به صورت زیر تعریف می شود که به آن بردار پرابند نیز می گویند.

$$\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3)$$



این شکل بردارهای \vec{a}, \vec{b} و $\vec{a} + \vec{b}$ را در دستگاه \mathbb{R}^3 نشان می دهد.

همان طور که از شکل روبه رو پیداست برای هر دو بردار غیر صفر \vec{a}, \vec{b} می توان روش متوازی الاضلاع را در صفحه ای که از آن دو بردار می گذرد به کار برد و بردار پرابند $\vec{a} + \vec{b}$ را یافت.

الف :

$$\vec{a} + \vec{b} = (3, 5, 2) + (-1, 2) = (2, 5, 4)$$

ب :

$$\vec{c} = (-2, -3) \Rightarrow -\vec{c} = (+2, +3)$$

$$\vec{d} = (+2, -3) \Rightarrow -\vec{d} = (-2, +3)$$

ج :

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b}) = (3, 5, 2) + (+1, -2) = (4, 5, 0) \Rightarrow |\vec{a} - \vec{b}| = 4, 5$$

$$\vec{d} - \vec{c} = \vec{d} + (-\vec{c}) = (+2, -3) + (+2, +3) = (+4, 0) \Rightarrow |\vec{d} - \vec{c}| = 4$$

د :

$$\vec{a} = (3, 5, 2) = 3i + 5j + 2k$$

$$\vec{b} = (-1, +2) = -i + 2j$$




$$\vec{c} = (-2, -3) = -2i - 3j$$

$$\vec{d} = (+2, -3) = 2i - 3j$$

$$\vec{a} + \vec{b} = (2, 5, 4) = 2i + 5j + 4k$$


$$\vec{a} - \vec{b} = (4, 5, 0) = 4i + 5j$$

$$\vec{d} - \vec{c} = (+4, 0) = 4i$$




برای هر عدد حقیقی r ، حاصل ضرب r در بردار \vec{a} را به صورت زیر تعریف می کنند.
 $r\vec{a} = r(a_1, a_2, a_3)$

این شکل دو بردار $r\vec{a}$ ، \vec{a} که در آن $r > 1$ را نشان می دهد.
 آیا راستای $r\vec{a}$ ، \vec{a} با هم متفاوت اند؟





به طور خاص بردار $-\vec{a}$ را که با $-\vec{a}$ نشان می دهند قرینه \vec{a} می گویند یعنی $-\vec{a} = (-a_1, -a_2, -a_3)$. این بردار هم اندازه با \vec{a} (چرا؟) ولی در خلاف جهت آن می باشد. اکنون تفاضل بردار \vec{b} از \vec{a} یعنی $\vec{a} - \vec{b}$ به صورت زیر تعریف می کنیم.
 $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b}) = (a_1 - b_1, a_2 - b_2, a_3 - b_3)$



در شکل بردارهای \vec{a} ، \vec{b} و قرینه آن و نیز $\vec{a} - \vec{b}$ نمایش داده شده اند.

کاردرکلاس

نقاط $A = (2, 3, 1)$ ، $B = (-1, 2, 2)$ را در $C = (3, 4, 0)$ و $D = (1, 0, -1)$ یک دستگاه \mathbb{R}^3 در نظر بگیرید، اگر بردارهایی در \mathbb{R}^3 با نقاط انتهایی به ترتیب A, B, C, D باشند آنها را در دستگاه فوق نشان دهید و هر یک از بردارهای زیر را به دست آورید.




$$\vec{a} + 2\vec{b} = (2, 3, 1) + (-2, 4, 4) = (0, 7, 5)$$

$$\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (2, 3, 1) + [(-1, 2, 2) + (3, 4, 0)] = (2, 3, 1) + (2, 6, 2) = (4, 9, 3)$$

$$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = [(2, 3, 1) + (-1, 2, 2)] + (3, 4, 0) = (1, 5, 3) + (3, 4, 0) = (4, 9, 3)$$

$$-2(\vec{b} + \vec{c}) = -2[(-1, 2, 2) + (3, 4, 0)] = -2(2, 6, 2) = (-4, -12, -4)$$

$$-2\vec{b} - 2\vec{c} = -2(-1, 2, 2) - 2(3, 4, 0) = (+2, -4, -4) + (-6, -8, 0) = (-4, -12, -4)$$



خواص جمع بردارها

در کار در کلاس قبل درستی برخی روابط و اعمال بین بردارها را بررسی کردیم. به طور کلی اگر $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ سه بردار دلخواه و $\vec{O}=(0,0,0)$ بردار صفر و نیز r و s دو عدد حقیقی باشند روابط زیر همواره برقرارند.

$$1- \vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a} \quad (\text{خاصیت جابه‌جایی جمع})$$

$$2- \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} \quad (\text{خاصیت شرکت‌پذیری در جمع})$$

$$3- \vec{a} + (-\vec{a}) = (-\vec{a}) + \vec{a} = \vec{O} \quad (\text{عضو قرینه})$$

$$4- \vec{a} + \vec{O} = \vec{O} + \vec{a} = \vec{a} \quad (\text{عضو خنثی})$$

$$5- r(\vec{a} + \vec{b}) = r\vec{a} + r\vec{b}$$

$$6- (r+s)\vec{a} = r\vec{a} + s\vec{a}$$

$$7- (rs)\vec{a} = r(s\vec{a})$$

$$8- \text{اگر } \vec{b} = r\vec{a} \text{ آنگاه } |\vec{b}| = |r||\vec{a}| \quad (|r| \text{ قدر مطلق } r \text{ است})$$

بردارهای یکه

با بردارهای یکه \vec{i}, \vec{j} در صفحه \mathbb{R}^2 به ترتیب در جهت محور x ها و y ها آشنا شدید. به طور مشابه در \mathbb{R}^3 بردارهای زیر را با طول واحد در جهت محورهای مختصات \mathbb{R}^3 در نظر می‌گیرند.

$$\vec{i} = (1, 0, 0), \vec{j} = (0, 1, 0), \vec{k} = (0, 0, 1)$$


به این ترتیب \vec{i} بردار یکه در جهت محور طول‌ها، \vec{j} بردار یکه در جهت محور عرض‌ها و \vec{k} بردار یکه در جهت محور ارتفاع‌ها می‌باشند.

همچنین با استفاده از روابط بین بردارها به سادگی می‌توان نشان داد که هر بردار مانند $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ به صورت ترکیبی از بردارهای یکه $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ قابل بیان است. در واقع داریم:

$$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3) = a_1(1, 0, 0) + a_2(0, 1, 0) + a_3(0, 0, 1) = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$$

مثال: بردار $\vec{a} = (\frac{1}{4}, 3, 2)$ را برحسب بردارهای یکه $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ و نشان دهید.

$$\vec{a} = \frac{1}{4}\vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}$$




مخبرستان

مخبرستان

۱- چهار نقطه در دستگاه مختصات مقابل مشخص شده اند.
 الف) معادلات مشخص کننده سطح محدود شده به چهارضلعی $ABDC$ را بنویسید.


ب) معادلات یکی از سطوحی که با سطح $ABDC$ هم مساحت و موازی هستند را بنویسید.



۲- نقاط با مختصات $S = (-2, -2, -2)$, $R = (3, 0, -1)$, $Q = (0, -1, -2)$, $P = (1, 0, 1)$ را در یک دستگاه مختصات نمایش دهید.

۳- در سؤال قبل طول پاره خط‌های PQ , RQ و PS را بیابید.

۴- فرض کنید $Q = (x_1, y_1, z_1)$ و $P = (x_2, y_2, z_2)$. مختصات نقطه M وسط پاره خط PQ را بیابید.



۵- در هر کدام از حالات زیر بردار خواسته شده را بیابید.


الف) $r\vec{a} - \vec{b} = ?$ ، $r = 3$ ، $\vec{b} = (\sqrt{2}, 1, 1)$ ، $\vec{a} = (-\frac{1}{3}, 0, 2)$

ب) $r\vec{a} + \vec{b} = ?$ ، $r = -1$ ، $\vec{b} = (3, 1, -1)$ ، $\vec{a} = 3\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$

ج) $\vec{a} + \vec{b} = ?$ ، $\vec{b} = 3\vec{j} + \vec{k}$ ، $\vec{a} = \sqrt{2}\vec{i} - \vec{k}$

د) $r\vec{a} + \vec{b} = ?$ ، $r = \frac{1}{5}$ ، $\vec{b} = -\vec{k} + \vec{i}$ ، $\vec{a} = 5\vec{k} + \vec{j}$

۶- طول بردار \vec{a} را در هر یک از حالات سؤال قبل بیابید.



پاسخ تمرین ۱:


الف:

$$A(2, 1, 3), B(-1, 1, 3) \Rightarrow AB: (y=1, z=3; -1 \leq x \leq 2)$$

$$B(-1, 1, 3), D(-3, -1, 3) \Rightarrow BD: (y=x+2, z=3; -3 \leq x \leq -1)$$

$$D(-3, -1, 3), C(2, -1, 3) \Rightarrow DC: (y=-1, z=3; -3 \leq x \leq 2)$$

$$A(2, 1, 3), C(2, -1, 3) \Rightarrow AC: (x=2, z=3; -1 \leq y \leq 1)$$



ب:


$$A'(2, 1, 0), B'(-1, 1, 0) \Rightarrow A'B': (y=1, z=0; -1 \leq x \leq 2)$$

$$B'(-1, 1, 0), D'(-3, -1, 0) \Rightarrow B'D': (y=x+2, z=0; -3 \leq x \leq -1)$$

$$D'(-3, -1, 0), C'(2, -1, 0) \Rightarrow D'C': (y=-1, z=0; -3 \leq x \leq 2)$$

$$A'(2, 1, 0), C'(2, -1, 0) \Rightarrow A'C': (x=2, z=0; -1 \leq y \leq 1)$$

پاسخ تمرین ۲:



پاسخ تمرین ۳:

$$PQ = \sqrt{(x_Q - x_P)^2 + (y_Q - y_P)^2 + (z_Q - z_P)^2} \Rightarrow PQ = \sqrt{(0-1)^2 + (-1-0)^2 + (-2-1)^2} = \sqrt{1+1+9} = \sqrt{11}$$

$$RQ = \sqrt{(x_Q - x_R)^2 + (y_Q - y_R)^2 + (z_Q - z_R)^2} \Rightarrow RQ = \sqrt{(0-3)^2 + (-1-0)^2 + (-2+1)^2} = \sqrt{9+1+1} = \sqrt{11}$$

$$PS = \sqrt{(x_S - x_P)^2 + (y_S - y_P)^2 + (z_S - z_P)^2} \Rightarrow PS = \sqrt{(-2-1)^2 + (-2-0)^2 + (-2-1)^2} = \sqrt{9+4+9} = \sqrt{22}$$

پاسخ تمرین ۴:

$$x_M = \frac{x_P + x_Q}{2}, y_M = \frac{y_P + y_Q}{2}, z_M = \frac{z_P + z_Q}{2} \Rightarrow M\left(\frac{x_P + x_Q}{2}, \frac{y_P + y_Q}{2}, \frac{z_P + z_Q}{2}\right)$$

$$r\bar{a} - \bar{b} = 3\left(-\frac{1}{3}, 0, 2\right) - (\sqrt{2}, 1, 1) = (-1, 0, 6) - (\sqrt{2}, 1, 1) = (\sqrt{2} - 1, -1, 5) \quad \text{الف:}$$

$$r\bar{a} + \bar{b} = -1(3, 2, -1) + (3, 1, -1) = (-3, -2, +1) + (3, 1, -1) = (0, -1, 0) \quad \text{ب:}$$

$$\bar{a} + \bar{b} = (\sqrt{2}, 0, -1) + (0, 3, 1) = (\sqrt{2}, 3, 0) \quad \text{ج:}$$

$$r\bar{a} + \bar{b} = \frac{1}{5}(0, 1, 5) + (1, 0, -1) = \left(0, \frac{1}{5}, 1\right) + (1, 0, -1) = \left(1, \frac{1}{5}, 0\right) \quad \text{د:}$$

$$\bar{a} = \left(-\frac{1}{3}, 0, 2\right) \Rightarrow |\bar{a}| = \sqrt{\left(-\frac{1}{3}\right)^2 + 0^2 + 2^2} = \sqrt{\frac{37}{9}} = \frac{\sqrt{37}}{3} \quad \text{الف:}$$

$$\bar{a} = (3, 2, -1) \Rightarrow |\bar{a}| = \sqrt{3^2 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{14} \quad \text{ب:}$$

$$\bar{a} = (\sqrt{2}, 0, -1) \Rightarrow |\bar{a}| = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + 0^2 + (-1)^2} = \sqrt{3} \quad \text{ج:}$$

$$\bar{a} = (0, 1, 5) \Rightarrow |\bar{a}| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 5^2} = \sqrt{26} \quad \text{د:}$$

گروه ریاضی استان خوزستان