


درس ۲


دنباله‌های حسابی

فعالیت

یک قطار باری از ایستگاهی در 60 کیلومتری بندرعباس بارگیری کرده است و مطابق نمودار مکان – زمان زیر با سرعتی ثابت به سمت طبس حرکت می‌کند.




- الف) ضابطه تابع و دامنه و برد آن را بدست آورید.
- (ب) اگر راهبر این قطار به دلایلی مانند رعایت سرعت مجاز و امنیت قطار موظف باشد پس از حرکت، مسافت طی شده در هر «یک ساعت» را به مرکز بندرعباس گزارش دهد، این نقاط را به کمک نمودار (۱) در نمودار (۲) کامل کنید.



ج) ضابطه و دامنه و برد نمودار (۲) چه تفاوتی با نمودار (۱) دارند؟

دامنه و برد نمودار (۱) زیر مجموعه از اعداد حقیقی
و لی دامنه و برد نمودار (۲) زیر مجموعه از اعداد طبیعی است.



د) جدول ۱ را به کمک نقشه داده شده کامل کنید.

جدول ۱

نام دو ایستگاه متواالی	مسافت	فاصله تا بندر عباس
ایستگاه بارگیری - نزرج	۱۲۵	$۶۰ + ۱۲۵ = ۱۸۵$
نزرج - گلگهر	۱۴۵	$۱۸۵ + ۱۴۵ = ۳۳۰$
گلگهر - سیرجان	۹۰	$۳۳۰ + ۹۰ = ۳۹۰$
سیرجان - میمند	۱۵۰	$۳۹۰ + ۱۵۰ = ۵۴۰$
میمند - بافق	۱۴۵	$۵۴۰ + ۱۴۵ = ۶۸۵$
بافق - جندق	۱۳۰	$۶۸۵ + ۱۳۰ = ۸۱۵$
جندق - طبس	۱۴۰	$۸۱۵ + ۱۴۰ = ۹۵۵$

ه) با فرض اینکه a_n مسافت طی شده قطار n ساعت پس از ترک ایستگاه بارگیری باشد، جدول ۲ را به کمک نمودار (۲) کامل کنید.

جدول ۲

$n=1$	$n=2$	$n=3$	$n=4$	$n=5$
$a_1 = ۹^\circ + ۹^\circ = ۱۸^\circ$	$a_2 = a_1 + ۹^\circ = ۱۸^\circ + ۹^\circ = ۲۷^\circ$	$a_3 = a_2 + ۹^\circ = ۲۷^\circ + ۹^\circ = ۳۶^\circ$	$a_4 = a_3 + ۹^\circ = ۳۶^\circ + ۹^\circ = ۴۵^\circ$	$a_5 = a_4 + ۹^\circ = ۴۵^\circ + ۹^\circ = ۵۴^\circ$
$a_6 = ۹^\circ + ۹^\circ = ۱۸^\circ$	$a_7 = a_6 + ۹^\circ = ۱۸^\circ + ۹^\circ = ۲۷^\circ$	$a_8 = a_7 + ۹^\circ = ۲۷^\circ + ۹^\circ = ۳۶^\circ$	$a_9 = a_8 + ۹^\circ = ۳۶^\circ + ۹^\circ = ۴۵^\circ$	$a_{10} = a_9 + ۹^\circ = ۴۵^\circ + ۹^\circ = ۵۴^\circ$

و) با مقایسه جدول های ۱ و ۲، کدام ایستگاه ها محل تماس راهبر قطار بوده اند؟ چرا؟

ایستگاه های حق معاشه مدنی و فاصله

(ز دو جمله)

۶۲

$a_v = ۷۹^\circ$
فاصله ۷۹° کلو متری

ز) با توجه به جدول ۲، ابتدا تساوی‌های زیر را کامل کنید.

$$\begin{cases} a_2 = a_1 + \dots \textcolor{red}{9}_\circ \\ a_2 = a_1 + \dots \textcolor{red}{2} \dots \times 9^\circ \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_4 = a_1 + \dots \textcolor{red}{9}_\circ \\ a_4 = a_1 + \dots \textcolor{red}{4} \dots \times 9^\circ \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_{11} = a_1 + \dots \textcolor{red}{9}_\circ \\ a_{11} = a_1 + \dots \textcolor{red}{1} \textcolor{red}{5} \dots \times 9^\circ \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_8 = a_2 + \dots \textcolor{red}{4} \dots \times 9^\circ \\ a_8 = a_5 + \dots \textcolor{red}{3} \dots \times 9^\circ \end{cases}$$

(۸-۷)

از روابط بالا می‌توان نتیجه گرفت:

$$a_n = a_1 + (\textcolor{red}{n-1}) \times 9^\circ \quad (1)$$

$$a_n - a_{n-1} = \dots \textcolor{red}{9}_\circ \quad (\text{رابطه بازگشتی})$$

$$a_n - a_m = (\textcolor{red}{n-m}) \times 9^\circ$$

ح) کدام ویژگی دنباله a_n باعث برقراری روابط بالا شده است؟ **اهمیت دستن ۹۰ به هر جمله برای تعیین جمله‌ی بعدی**
ط) رابطه (۱) در قسمت «ز» چه ارتباطی با ضابطه تابع به دست آمده در قسمت «الف» دارد؟

$$a_n = a_1 + (n-1)(9^\circ)$$

$$\rightarrow a_n = a_1 + 9^\circ n - 9^\circ$$

$$a_1 = 15^\circ \rightarrow a_n = 9^\circ n + 45^\circ$$

$$y = 9^\circ x + 75^\circ$$

دنباله حسابی^۱

نکته قابل توجه در دنباله مطرح شده در فعالیت، یعنی دنباله «مسافت طی شده در هر گزارش»، این است که افزایش جملات دنباله منظم است؛ به گونه‌ای که براساس هر دو جمله متولی، جمله بعدی مشخص می‌شود. چنین دنباله‌هایی که هر جمله آنها به جز جمله اول، از اضافه شدن یک عدد ثابت به جمله پیشین به دست می‌آید، دنباله‌های «حسابی» نامیده می‌شوند.

یک دنباله حسابی، دنباله‌ای به صورت:

$$a, a+d, a+2d, a+3d, \dots$$

است که در آن a جمله اول و عدد ثابت d «اختلاف مشترک» جملات دنباله است. جمله n ام این دنباله با رابطه d $a_n = a_1 + (n-1)d$ معرفی می‌شود.

را اختلاف مشترک^۲ دنباله حسابی می‌نامند؛ زیرا همه جملات دنباله در یک ویژگی مشترک‌اند و آن اینکه اختلاف آنها مقدار ثابت d است.

۱. Arithmetic Sequence

۲. Common Difference


کار در کلاس

- $a_{n+1} - a_n = d$
- ضابطه بازگشتن دنباله حسابی با جمله اول a_1 و اختلاف مشترک d را مشخص کنید.
 - مثبت یا منفی یا صفر بودن «اختلاف مشترک»، d ، چه تأثیری در جملات دنباله حسابی دارد؟
 - جدول زیر را کامل کنید.

جمله اول	اختلاف مشترک	پنج جمله اول	a_n
a	d	$a, a+d, a+2d, a+3d, a+4d, \dots$	$a_n = a + (n-1)d$
۲	۳	۲, ۵, ۸, ۱۱, ۱۴, ...	$a_n = 2 + 3(n-1)$
۴	-۳	۴, ۱, -۲, -۵, -۸, ...	$a_n = 4 + (n-1)(-3)$
۴	$-\frac{1}{2}$	$\frac{4}{2}, \frac{3}{2}, \frac{2}{2}, \frac{1}{2}, 0, \dots$	$a_n = 4 + (n-1)(-\frac{1}{2})$
-۳	۵	-۳, ۲, ۷, ۱۲, ۱۷, ...	$a_n = -3 + 5(n-1)$

کار در کلاس

قنات یا کاریز، راه آب یا کانالی است که در زیرزمین کنده شده است تا آبی را که از حفر چاه اصلی (نخستین چاه) به نام «مادرچاه» به دست آمده است، به منطقه‌ای دیگر انتقال دهد. برای حفر کanal، مطابق شکل زیر، از چاه‌های کمکی به نام «میله» استفاده می‌کنند. میله‌ها برای رساندن اکسیژن و نیز کمک به مقنی در خارج کردن خاک‌های حاصل از حفر کanal و بعدها برای کمک به لایروبی و تعمیر قنات حفر می‌شوند.



در یک منطقه، مقنی پس از حفر چاه در عمق ۳۰ متری سطح زمین، به آب زیرزمینی دست یافته و در این عمق شروع به حفر کanal قنات کرده است. با توجه به شبیث ثابت زمین و حفر چاه‌های کمکی در فاصله‌های یکسان از هم، عمق میله اول $29/5$ متر و میله دوم 29 متر بوده و به همین ترتیب، عمق میله کاهش یافته است. اگر عمق آخرین میله $1/5$ متر باشد، این مقنی در مجموع چند

چاه حفر کرده است؟

$$\begin{array}{ccccccc}
& & \text{۳۰} & \text{میله اول} & \text{۲۹} & \text{میله از} & \\
& & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
& & a_1 & & a_2 & & a_n \\
& & 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, \dots, 1, 0 & & 64 & & a_n = n
\end{array}$$

$$a_n = a_1 + (n-1)(-1)$$

$$\rightarrow 1, 0 = 30 + (n-1)(-1) \rightarrow 1, 0 - 30 = -1(n-1) \rightarrow -29 = -1(n-1) \rightarrow n = 29$$

۱. مقنی: به کسی می‌گویند که کanal را حفر می‌کند.

$$n = \text{تعداد چاهها}$$

$$\rightarrow -29 = -1(n-1) \rightarrow n = 29$$

خواندنی سدی کهنه در دل خاک

اگرچه به نظر می‌رسد مدیریت منابع طبیعی، رشته‌ای نوپا، مهم و حیاتی در بسیاری از دانشگاه‌های دنیاست، با نگاهی به تاریخ گذشته سرزمینمان متوجه می‌شویم که چگونه ایرانیان از هزاران سال پیش با فرهنگ ساختن کاریز و قنات، به استفاده بهینه از منابع طبیعی توجه داشته‌اند. چنان که در سفرنامه ناصرخسرو به قنات گتاباد اشاره شده است؛ قناتی با عمق مادر چاه بیش از سیصد متر و ارتفاع یک برج 100° طبقه و با عمری سه هزارساله.

حفر صدھا چاه و ایجاد هزاران متر کanal قنات برای انتقال آب حتی با وسائل امروزی، آن هم در مسیرهای خشک و کویری و در گرمای طاقت‌فرسا، کاری بس عظیم و بی‌همتاست که نه تنها شناس از صبر و شکیبایی دارد، بلکه شاید پیش از هر چیز بیانگر عشق نیاکان ما به زندگی و تلاش برای تداوم آن در نسل‌های آینده‌شان است.

انسان‌هایی که معضل عظیم بی‌آبی را نه تنها علتی برای کوچ نمی‌دانستند، بلکه با دانش و تفکر و هوشمندی و برنامه‌ریزی بلندمدت، آرام آرام ده‌ها هزار متر مکعب خاک را از اعمق زمین جا به جا کردند تا دسترسی به منبع حیات را برای نسل‌های بعدی شان فراهم سازند. تنها با نگاه به یکی از قنات‌های موجود در ایران، مانند قنات زارچ بزد که برای ایجاد آن پیش از هشتاد هزار متر کanal و چاه در دل کویر حفر شده است و با دانستن اینکه یک مقنی شاید در طول یک روز پیش از دو یا سه متر حفاری انجام نمی‌داده است، مشخص می‌شود که حتی با یک گروه حفاری، اتمام این قنات به چندین ده سال کار بی‌وقفه نیاز داشته است. کاری دشوار که هر روز و هر لحظه آن جدال مستقیم با مرگ بوده است؛ زیرا باریش خاک به ویژه در زمین‌های سست کویری و در عمق چندین ده متر از سطح زمین، کمترین احتمالی برای زندگاندن مقنی قابل تصور نبوده است. این گونه بوده است که این افراد کار هر روزه خود را با لباس سفید و اشهدگویان شروع می‌کرده‌اند.

فرهنگ ایجاد کاریز افزون بر موارد فوق، نشان از دیگر جنبه‌های هوشمندی ایرانیان نیز دارد. نخست، با ایجاد شبیه ملائم هنگام حفر کanal و به کمک گراش زمین نیازی به وجود بمب برای انتقال آب نبوده است. با توجه به نبود وسائل مهندسی

امروزی برای جهت‌یابی و تعیین زاویه حفر، انجام دادن این عمل در گذشته بسیار دشوار بوده است. دوم، فرهنگ ایجاد کاریز، ذخیره‌سازی آب در عمق زمین و درون چاه‌ها را ممکن می‌ساخته است. از آن رو که در سده‌های آبی مقادیر زیادی از آب در معرض خورشید تغیر می‌شود، پیشینیان ما باستن آب در انتهای یکی از میله چاه‌ها، آب را توسط چاه‌های قنات در اعمق زمین از تابش مستقیم آفتاب حفاظت می‌کرده‌اند؛ به بیانی دیگر، قنات‌ها سدهایی زیرزمینی بوده‌اند.

در گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحده (فانو) با عنوان «اهمیت میراث سیستم‌های سنتی کشاورزی» سال ۲۰۱۴ ضمن به رسمیت شناختن این میراث در سطح جهانی و حفظ آن جهت نیل به توسعه پایدار، نوشته شده است: «قدمت فناوری و دانش سیستم آبیاری سنتی در ایران، و حفر کاریز، دست کم به 80° سال پیش از میلاد می‌رسد و تزدیک به سه هزاره زنده مانده است. شبکه آبیاری سیستم قنات توانسته است به طور پایدار، امنیت غذایی و معیشت خانوارهای کشاورزان را فراهم آورد.»

بیش از 40° هزار قنات در ایران منابع پایدار با ارزشی هستند که توجه دوباره به آنها شاید بخشی از راه حل سازگاری با شرایط اقلیمی کشورمان در جهت تأمین منابع آب باشد؛ منابعی که امروز برای ایجاد دوباره آنها نیاز به هزاران میلیارد تومان سرمایه و هزاران ساعت کار انسانی است. میراثی با ارزش که نیاکانمان باشکیبایی و عشق برای ما به یادگار گذاشته‌اند.

۱. طبق گزارش‌های رسمی، میانگین یارش جوی کشور 412 میلیارد متر مکعب است که تزدیک به 296 میلیارد متر مکعب آن در سال تغیر می‌شود. اگر تغییر منابع آب زیرزمینی و ذخیره‌سازی آن توسط قنات‌ها تنها ده درصد از تغییر آب را کاهش دهد، به طور میانگین تزدیک به 30 میلیارد متر مکعب به حجم آب مورده استفاده افزوده می‌شود که عددی بسیار چشمگیر است.

فعالیت

$$n=1 \rightarrow a_1 = 3+2(1-1) = 3+0 = 3$$

$$n=2 \rightarrow a_2 = 3+2(2-1) = 3+2 = 5$$

$$n=3 \rightarrow a_3 = 3+2(3-1) = 3+2 = 7$$

$$n=4 \rightarrow a_4 = 9$$

$$n=5 \rightarrow a_5 = 11$$

دنباله حسابی $(n-1)$ را در نظر بگیرید.

الف) با محاسبه سه جمله دیگر دنباله، نمودار زیر را کامل کنید.

ب) معادله خطی را که از دو نقطه اول و دوم می‌گذرد، بدست آورید. آیا نقاط دیگر دنباله در ضابطه خط بدست آمده صدق می‌کنند؟


$$m = \frac{5-3}{4-1} = 2$$

$$y = 2x + 1$$

برای خطا

ج) شیب خط بدست آمده چه ارتباطی با d (اختلاف مشترک دنباله حسابی) دارد؟

$$d = m = 2 \quad \text{مساویند.}$$



اگر جمله عمومی یک دنباله حسابی را بنویسیم، یک معادله خط خواهد شد. هر دنباله حسابی یک تابع خطی است که شیب خط، همان اختلاف مشترک جملات دنباله، یعنی d است و به عکس، دنباله ساخته شده از یک تابع خطی نیز جملات یک دنباله حسابی را مشخص می‌کند.

کار در کلاس

جدول زیر را کامل کنید.


ضابطه تابع	دنباله ساخته شده از تابع	چهار جمله اول دنباله	نمودار دنباله
$y = 2x - 1$	$a_n = 2n - 1$	1, 3, 5, 7	
$y = -x + 4$	$a_n = -n + 4$	3, 2, 1, 0, ...	
$y = x - 2$	$a_n = n - 2$	-1, 0, 1, 2, ...	
$y = \frac{1}{r}x - \frac{Q}{r}$	$a_n = \frac{1}{r}n - \frac{Q}{r}$	$-2, -\frac{r}{2}, -1, -\frac{1}{2}$	

$$y = mx + h$$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$h = y_1 - mx_1$$

فعالیت



پس از مصرف بعضی از داروها، مانند آسپرین، سطح دارو در خون با سرعتی ثابت صفر می‌شود.^۱ اگر شخصی که سابقه سکته قلبی دارد با مصرف یک قرص آسپرین، ۲۵۰ میلی‌گرم دارو به بدن وارد شود و پس از پایان هر یک ساعت ۱۵ میلی‌گرم دارو در سطح خونش کاهش باید:



- (الف) چند ساعت پس از مصرف دارو، سطح آن در بدن ۱۳۰ میلی‌گرم می‌شود؟
- (ب) نمودار «سطح دارو در بدن - زمان» مسئله بالا رسم کنید.
- (ج) اگر پس از پنج ساعت از مصرف دارو این شخص قرص دیگری مصرف کند، پس از چند ساعت سطح دارو در بدن او ۱۳۰ میلی‌گرم خواهد شد؟

کار در کلاس

درآمد یک کارمند در یک شرکت خصوصی، ماهیانه ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان است که ۱۰٪ آن به عنوان مالیات کسر می‌شود. اگر این شخص برای هر ساعت اضافه کاری ۱۱ هزار تومان از شرکت دریافت کند و بابت این اضافه کاری مالیات پرداخت نکند، پس از روزانه چند ساعت اضافه کاری دریافتی خالص ماهیانه او ۳ میلیون تومان خواهد بود؟ (ماه را ۳۰ روزه در نظر بگیرید).

با توجه به فرض مسئله مبنی بر دریافت ۱۱ هزار تومان اضافه کاری برای هر یک ساعت کار، میزان دریافتی این شخص پس از k ساعت اضافه کاری از یک دنباله عددی پیروی می‌کند؛ زیرا:



بنابراین، اگر a_1 میزان دریافتی شخص بدون اضافه کاری و پس از کسر مالیات باشد، جمله آخر دنباله باید برابر با مبلغ تومان باشد؛ یعنی در رابطه

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

باید

^۱. این داروها را در داروشناسی Zero Order Kinetics می‌نامند.

حل فعالیت صفحه ۶۸

شروع	پیان ساعت اول	پیان ساعت دوم	پیان ساعت سوم	پیان ساعت پنجم	پیان ساعت ششم	پیان ساعت هفتم	پیان ساعت هشتم
۲۵۰	۲۳۵	۲۲۰	۲۰۵	۱۹۰	۱۷۵	۱۶۰	۱۴۵


$$a_1 = 235 \text{ و } a_2 = 205 \text{ و } a_3 = 190 \text{ و } \dots$$

الف : در محاسبه از الگوی دنباله ای حسابی استفاده می کنیم.

$$a_n = -15n + 250 \xrightarrow{a_n = 130} -15n + 250 = 130 \rightarrow -15n = -120 \rightarrow n = 8$$

طبق جدول و الگوی پس از ۸ ساعت سطح دارو به ۱۳۰ میلی گرم می رسد.

ب :



تقریبی (n)	پیان ساعت اول	پیان ساعت دوم	پیان ساعت سوم	پیان ساعت چهارم	پیان ساعت پنجم	پیان ساعت ششم	پیان ساعت هفتم	پیان ساعت هشتم
۲۵۰	۲۳۵	۲۲۰	۲۰۵	۱۹۰	۱۷۵	۱۶۰	۱۴۵	۱۳۰
b_m	*	*	*	*	۴۲۵	۴۱۰	۳۹۵	۳۸۰
m	*	*	*	*	*	۱	۲	۳

$$b_1 = 410 \text{ و } b_2 = 395 \text{ و } b_3 = 380 \dots$$

$$b_n = -15m + 425 \xrightarrow{b_m=130} -15m + 425 = 130 \rightarrow -15m = -295 \rightarrow m = 19/66$$

لذا پس از $6/19 = 24/6 = 4$ ساعت و ۱۰ دقیقه مجدداً میزان دارو به ۱۳۰ میلیگرم می

رسد.

حل کاردکلاس صفحه ۶۸

$$26000000 \times \frac{10}{100} = 2600000 \text{ مالیات حقوق ثابت (تومان)}$$

$$26000000 - 2340000 = 2600000 \text{ دریافتی ثابت (تومان)}$$

$$(تومان) 3000000 = \text{دریافتی کل اضافه کاری} + \text{دریافتی ثابت}$$

$$(تومان) 23400000 = \text{دریافتی کل اضافه کاری} + 3000000$$

$$(تومان) 660000 = \text{دریافتی کل اضافه کاری} \rightarrow$$

این میزان اضافه کاری مورد نیاز است. حال چون دریافتی اضافه کاری برای هر ساعت برابر ۱۱۰۰۰ تومان است. لذا این شخص باید $60 = 11000 \div 11000$ ساعت کار کند.

و چون ماه را ۳۰ روزه فرض می کنیم. این شخص باید روزی $2 = 60 \div 30$ ساعت کار کند، تا دریافتی

وی به ۳ میلیون تومان برسد.

به کمک دنباله‌ی حسابی نیز می توان این محاسبه را انجام داد.

روز اول	روز دوم	روز سوم	...	روز n ام
۱۱۰۰۰	۲۲۰۰۰	۳۳۰۰۰	...	$11000n$

$$a_n = 11000n \xrightarrow{a_n=660000} 660000 = 11000n \rightarrow n = 60$$

مجموع n جمله اول یک دنباله عددی

در فعالیت «محاسبه تعداد چاه‌های قنات» مشخص شد که قنات موردنظر ۵۸ چاه دارد که عمق آنها دنباله حسابی $1/5, 2/5, \dots, 29/5, 29$ را تشکیل می‌دهد. فرض کنید یک مقنی در هر روز بتواند ۲ متر چاه حفر کند. می‌خواهیم بدانیم این مقنی به چند روز کار نیاز دارد تا مجموع چاه‌های گفته شده را حفر کند.

(الف) ابتدا باید بدانیم مجموع ۵۸ چاه حفر شده چند متر است.

برای این کار، مجموع عمق چاه‌ها را یک بار از عمیق‌ترین تا کم عمق‌ترین چاه و بار دیگر از کم عمق‌ترین تا عمیق‌ترین چاه با یکدیگر جمع می‌کنیم:

$$S_{58} = 30 + 29/5 + 29 + \dots + 2/5 + 2 + 1/5 : \text{مجموع ۵۸ چاه از مادر چاه تا آخرین میله}$$

$$S_{58} = 1/5 + 2 + 2/5 + \dots + 29 + 29/5 + 30 : \text{مجموع ۵۸ چاه از آخرین میله تا مادر چاه}$$

$$2S_{58} = 31/5 + 31/5 + \dots + 31/5 + 31/5$$

$$2S_{58} = 58 \times 31/5 \Rightarrow S_{58} = \frac{58 \times 31/5}{2} \Rightarrow S_{58} = 913/5 \text{ m}$$

(ب) با توجه به اینکه مقنی روزانه ۲ متر چاه حفر می‌کند:

$$\text{روز} = \frac{913/5}{2} = 456/75 = 456 \text{ روز} / 75 = \text{تعداد روز برای پایان کار}$$

بنابراین، مقنی بدون حتی یک روز استراحت تقریباً به ۱۵ ماه زمان نیاز دارد تا قنات موردنظر را تحويل دهد.

جمع کردن جملات یک دنباله به دو صورت محاسبه مجموع a_1 تا a_n و محاسبه مجموع a_1 تا a_n برای تعیین S ، روش جالبی است که می‌توانیم به کمک آن، مجموع n جمله اول یک دنباله حسابی را به دست آوریم:

مجموع n جمله اول یک دنباله حسابی $a_1 + (n-1)d$ از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) \quad \text{یا} \quad S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$$

رابطه بالا را در محاسبه مجموع چاه‌های حفر شده می‌توانیم مشاهده کنیم؛ زیرا:

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) \Rightarrow S_{58} = \frac{58}{2}(30 + 1/5) = 913/5$$

کار در کلاس

$$d = \omega$$

a_1, a_2	a_n
و ۹ و ۴ و ۱	۱۹۹ و و ۹ و ۴ و ۱ (الف)

۱. مجموع دنبالهای حسابی زیر را به دست آورید.

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

$$199 = -1 + (n-1)(\omega) \rightarrow 200 = \omega n - \omega \rightarrow n = \frac{200}{\omega} = 20$$

$$S_{21} = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) = \frac{21}{2}(-1 + 199) = 20 \cdot 20$$

ب) $a_{n+1} = \omega + a_n, a_1 = -2$ $S_n = ?$

$$-2, 5, 12, 19, \dots \quad n=1, \quad d = \omega$$

(راهنمایی: ابتدا به کمک رابطه بازگشتی، جملات دنباله را مشخص کنید.)

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$$


$$S_{10} = \frac{10}{2}(2(-2) + (10-1)(\omega)) = \omega(-4 + 9\omega)$$

$$= 20\omega$$

۲. مجموع سی جمله اول اعداد فرد را به دست آورید.

$$a_1 = 1 \quad a_n = a_1 + (n-1)d = 1 + (n-1)(2) = 2n-1 \quad a_{20} = 2(20)-1 = 39$$

$$S_{20} = \frac{20}{2}(1 + a_{20}) = 10(1 + 39) = 400$$



۳. یک طراح داخلی برای یک سالن سینما در ردیف اول ۱۵ صندلی، در ردیف دوم ۱۸ صندلی و در ردیف سوم ۲۱ صندلی مشخص کرده است. اگر صندلی‌های هر ردیف با همین نظم اضافه شوند، برای داشتن

سالنی با 870 صندلی باید چند ردیف صندلی داشته باشیم؟

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d) \rightarrow 870 = \frac{n}{2}(30 + 3n - 3) \rightarrow$$

$$870 = \frac{n}{2}(27 + 3n) \rightarrow 1740 = n(27 + 3n) \rightarrow 3n^2 + 27n - 1740 = 0$$

با توجه به معلوم بودن $S_n = 870$ برای به دست آوردن n یعنی تعداد ردیف‌ها، از رابطه

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$$

$$870 = \frac{n}{2}(2 \cdot 15 + (n-1)3) \rightarrow 870 = \frac{n}{2}(30 + 3n - 3) \rightarrow 870 = \frac{n}{2}(27 + 3n) \rightarrow 1740 = n(27 + 3n) \rightarrow 3n^2 + 27n - 1740 = 0$$

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$$

با جایگذاری $d = 3, a_1 = 15, S_n = 870$ در رابطه بالا $n = 20$ به دست می‌آید.

$$\rightarrow n^2 + 9n - 580 = 0 \rightarrow (n-20)(n+29) = 0 \quad \begin{cases} n = 20 \\ n = -29 \end{cases}$$

۷۰

حوله های دید عدد طبیعی باشند.

تمرین

۱. با نوشتن جملات رابطه‌های بازگشتی، مشخص کنید کدام یک دنباله حسابی است.

(الف) $a_{n+1} = \frac{1}{a_n}$ $a_1 = 2$


(ب) $a_{n+1} = a_n + 5$ $a_1 = -1$

(ج) $a_{n+1} = 5a_n + 1$ $a_1 = -1$

(د) $a_{n+1} - a_n = n$

۲. در یک دنباله حسابی، جمله اول برابر ۵ و اختلاف مشترک برابر ۸ است. کدام جمله دنباله برابر ۵۵۵ است؟

۳. یازدهمین جمله یک دنباله حسابی ۵۲ و جمله نوزدهم آن ۹۲ است. جمله سی ام این دنباله را مشخص کنید.



۴. برای کاهش مصرف آب در کشاورزی یک منطقه، از آبیاری قطره‌ای استفاده می‌شود؛ به این صورت که یک میله که در آن سوراخ‌هایی برای پخش آب تعبیه شده است، به کمک چرخ‌هایی (مطابق شکل مقابل) حول یک محور می‌چرخد. اگر فاصله اولین چرخ تا موتور ۳ متر و بعد از آن، فاصله هر چرخ تا چرخ بعدی ۵ متر باشد و در کل، ۱۲ چرخ روی میله قرار داشته باشد، با این وسیله چه مساحتی آبیاری می‌شود؟ (آخرین چرخ دقیقاً در انتهای میله قرار دارد).

۵. در یک کارخانه سنگبری برای صبیل دادن سنگ‌ها از یک صفحه به وزن 125° گرم استفاده می‌شود. اگر با توجه به مصرف هفتگی به طور میانگین 1875 گرم از وزن صفحه کم شود، پس از شش هفته استفاده مداوم وزن صفحه چقدر است؟

۶. میان دو عدد a و b عدد را به گونه‌ای قرار می‌دهیم که جملات دنباله از a تا b یک دنباله حسابی تشکیل دهند. ثابت کنید اختلاف مشترک جملات دنباله از رابطه $d = \frac{b-a}{n+1}$ به دست می‌آید. (توجه داشته باشید که تعداد کل جملات $(n+2)$ جمله است).

۷. براساس رابطه به دست آمده در مسئله ۸، سه عدد را به گونه‌ای میان اعداد 10 و 18 قرار دهید که یک دنباله حسابی تشکیل دهند.

۸. مجموع عددهای زیر را به دست آورید.
 (الف) $1 + 9 + 85 + \dots + 401$ (ب) $13 + 81 + \dots + 89$



۹. باغداران برای چیدن میوه‌ها از نرdban‌های استفاده می‌کنند که بخشی از آنها که روی زمین قرار می‌گیرد، برای تعادل بیشتر، عرض بیشتری دارد و انتهای نرdban که به درخت تکیه داده می‌شود، برای جابه‌جایی آسان‌تر و تکیه‌گاه بهتر، عرض کمتری دارد.

اگر عرض نخستین پله این نرdban ۱۲۵ سانتی‌متر و عرض آخرین پله آن ۴۵ سانتی‌متر در نظر گرفته شود و هر پله ۱۰ سانتی‌متر کوتاه‌تر از پله پیشین باشد، این نرdban چند پله خواهد داشت؟ برای ساخت پله‌ها به چند متر چوب احتیاج خواهیم داشت؟


۱۰. ارزش امروزی قنات زارج، طولانی‌ترین قنات ایران — عمق مادرچاه قنات زارج ۸۴/۶ متر است که از آن سه شاخه قنات خارج شده است. اگر تعداد میله‌های هر سه شاخه قنات برابر و عمق بنجاه و ششمین چاه (میله ۱۵۵م) ۷۸ متر باشد، با فرض اینکه شبب زمین ثابت و فاصله میان هر دو میله یکسان باشد و عمق آخرین چاه قنات (میله ۱۲۰) ۱۲ سانتی‌متر در نظر گرفته شود :

(الف) هر شاخه قنات دارای چند میله است؟

(ب) مجموع طول چاه‌های حفر شده در این مسیر چقدر است؟ مجموع طول چاه‌های حفر شده در کل قنات چقدر است؟

(ج) اگر میانگین هزینه حفر یک متر چاه (شامل حفر، مصالح و دیوارچینی) ۲۵ هزار تومان باشد، هزینه حفر چاه‌های قنات در حال حاضر چقدر است؟

(د) طبق محاسبات مهندسی، در قنات زارج در مجموع طول کل کanal قنات ۷۱ کیلومتر است. با توجه به میانگین هزینه ۳۵ هزار تومان برای حفر کanal قنات، ارزش کل قنات زارج چقدر است؟ (راهنمایی: a_n را عمق چاه $n^{\text{ام}}$ تا کanal قنات و a_1 را عمق مادرچاه در نظر بگیرید.)



پاسخ :

(الف) ۶۹۶ چاه شامل یک مادرچاه و ۶۹۵ میله

(ب) مجموع طول چاه‌ها در یک مسیر $29858/4$ متر و مجموع طول چاه‌ها در کل قنات ۸۹۴۰۶ متر

(ج) ۲۲,۳۵۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

(د) ۴۷,۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

حل تمرینهای صفحه‌ی ۷۱

تمرین ۱ :

(الف) و ۱۴ و ۹ و ۴ و ۱ - ب و ۱۶ و ۱۹ و ۴ و ۱ - ج

(د)

$n = 1$	$a_2 - a_1 = 1$
$n = 2$	$a_3 - a_2 = 2$
$n = 3$	$a_4 - a_3 = 3$
$n = 4$	$a_5 - a_4 = 4$
$n = 5$	$a_6 - a_5 = 5$
.....

در این مسئله جمله‌ی اول تعریف نشده است. اگر قرار دهیم $a_1 = k$ این دنباله به شکل زیر در می‌آید.

$k, k + 1, k + 2, k + 3, k + 4, k + 5, \dots$

مثالاً برای $k = 1$ می‌شود.

.... و ۱۶ و ۱۱ و ۷ و ۴ و ۲ و ۱

دنباله بند **ب** یک دنباله‌ی حسابی است ولی بقیه‌ی دنباله‌ها نیستند.

تمرین ۲ :

$$a_n = a_1 + (n-1)d \rightarrow ۵۵۵ = -۵ + (n-1)(\lambda) \rightarrow ۵۶۰ = \lambda n - \lambda$$

$$\rightarrow ۵۶۰ = \lambda n - \lambda \rightarrow ۵۶۸ = \lambda n \rightarrow n = \frac{۵۶۸}{\lambda} = ۷۱$$

تمرین ۳ :

$$a_n = a_1 + (n-1)d \xrightarrow{a_1 = a} \begin{cases} a_{11} = a + 10d \rightarrow a + 10d = ۵۲ \\ a_{19} = a + 18d \rightarrow a + 18d = ۹۲ \end{cases}$$

$$\rightarrow (a + 18d) - (a + 10d) = ۹۲ - ۵۲ \rightarrow 8d = ۴۰ \rightarrow d = ۵$$

$$a + 10d = ۵۲ \xrightarrow{d = ۵} a + 50 = ۵۲ \rightarrow a = ۲$$

اکنون برای تعیین جمله‌ی سوم به شکل زیر عمل می‌کنیم.

$$a_n = a_1 + (n-1)d \rightarrow a_3 = 2 + (3-1)(5) = ۱۴۷$$

تمرین ۴:

a_1	a_2	a_3		a_{12}
۳	۸	۱۳		?

$$a_n = a_1 + (n-1)d \rightarrow a_{12} = 3 + (12-1)(5) = 58$$

فاصله‌ی دوازدهمین(آخرین) چرخ تا موتور برابر ۵۸ متر است که برابر شعاع دایره‌ی ای است که این میله آبیاری می‌کند.

$$\text{متر مربع } S = \pi (58)^2 \approx 10562 / 96 \text{ مساحت آبیاری شده}$$

تمرین ۵:

$$a_1 = 12500 - 1875 = 10625$$

$$a_2 = 10625 - 1875 = 8750$$

$$a_3 = 8750 - 1875 = 6875$$

$$a_4 = 6875 - 1875 = 5000$$

این دنباله یک دنباله حسابی است و در آن $a_1 = 10625$ و $d = 1875$ پس :

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

$$\rightarrow a_6 = 10625 + (6-1)(-1875) = 12500 \text{ وزن صفحه پس از ۶ هفته (گرم)}$$

تمرین ۶: می‌توان دنباله‌ی حسابی در نظر گرفت که جمله‌ی اول آن a و جمله‌ی آخر آن b باشد. اگر قرار است بین b و a به تعداد m جمله قرار گیرد. در این صورت واضح است که این دنباله دارای $n = m + 2$ جمله است.

$$\begin{cases} a_1 = a \\ a_n = b \end{cases} \rightarrow a_n - a_1 = b - a \rightarrow (a_1 + (n-1)d) - a_1 = b - a \rightarrow (n-1)d = b - a \rightarrow d = \frac{b-a}{n-1} \xrightarrow{n=m+2} d = \frac{b-a}{(m+2)-1} = \frac{b-a}{m+1}$$

تمرین ۷:

$$d = \frac{b-a}{m+1} \rightarrow d = \frac{18-10}{3+1} = 2$$

لذا دو دنباله‌ی زیر را می‌توان نوشت:

.... و ۱۸ و ۱۶ و ۱۴ و ۱۲ و ۱۰ و

.... و ۱۰ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۸ و

تمرین ۸:

الف) اگر b جمله‌ی آخر و a جمله‌ی اول یک دنباله‌ی حسابی باشد. در این صورت: $d = b - a$ لذا می‌توان نتیجه گرفت:

$$n = \frac{b - a}{d} + 1$$

در اینجا نیز می‌توان نوشت:

$$n = \frac{b - a}{d} + 1 = \frac{۴۰۱ - ۱}{۴} + 1 = ۱۰۱$$

$$S = \frac{n}{2}(a + b) = \frac{۱۰۱}{2}(۱ + ۴۰۱) = ۱۰۱ \times ۲۰۱ = ۲۰۳۰۱$$

(ب)

$$n = \frac{b - a}{d} + 1 = \frac{۱۳ - ۸۹}{-۴} + 1 = ۲۰$$

$$S = \frac{n}{2}(a + b) = \frac{۲۰}{2}(۸۹ + ۱۳) = ۱۰ \times ۱۰۲ = ۱۰۲۰$$

تمرین ۹: می‌توان یک دنباله‌ی حسابی در نظر گرفت که در آن جمله‌ی اول ۱۲۵ و جمله‌ی آخر ۴۵ و اختلاف مشترک ۱۰ – باشد. در این مسئله تعداد جملات و مجموع جملات مورد نظر است.

$$n = \frac{b - a}{d} + 1 = \frac{۱۲۵ - ۴۵}{-۱۰} + 1 = ۹$$

$$S = \frac{n}{2}(a + b) = \frac{۹}{2}(۱۲۵ + ۴۵) = ۹ \times ۸۵ = ۷۶۵ \text{ متر} = ۷ / ۶۵ \text{ سانتی متر}$$
