

تاریخ امتحان: 17/10/1401

با اسمه تعالی

ساعت شروع: 10 صبح

وزارت آموزش و پرورش

نام: ..

مدت ارزشیابی: 120 دقیقه

اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

نام خانوادگی: ..

دی ماه سال تحصیلی 1401-1402

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دزفول

نام پدر: ..

تعداد 4 صفحه

نام آموزشگاه: متوسطه اول حجاب


دبیر: تکریمی

درس ریاضی پایه هشتم


شماره: ..

| ردیف | | بارم |
|------|--|------|
| 1 | درستی یا نادرستی هر عبارت را تعیین نمایید. | 1 |
| | الف) اگر شکلی محور تقارن نداشته باشد، مرکز تقارن هم ندارد. ب) 5 ضلعی منتظم مرکز تقارن دارد. ج) متوازی الاضلاعی که دو ضلع مجاور آن باهم برابر باشند، لوزی نامیده می شود. د) برای دو عدد 547 و 548 رابطه $1 = (547, 548)$ برقرار است. درست | |
| 2 | جاهای خالی را تکمیل نمایید. الف) همه اعداد گویا معکوس دارند به جز ب) تنها عدد اول زوج است. ج) بردار یکه محور x ها، است. د) مجموع زوایای خارجی هرگونه چند ضلعی محدب است. | 1 |
| 3 | گزینه درست را علامت بزنید الف) کدام عدد گویا نیست? ب) کدام عدد نسبت به 14 اول است? ج) کدام شکل محور تقارن ندارد? د) متوالی الاضلاع $(1, 4, 3, 2)$ دایره د) در معادله مختصاتی $3\vec{X} = \begin{bmatrix} -3 \\ 12 \end{bmatrix}$ ، مختصات بردار X کدام است? $\begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ -4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix}$ | 1 |
| 4 | حاصل عبارت را بیابید. الف) $4 - (3 - (1 - 5)) =$ ب) $(-8 + 15 + 3) \div (-2) =$ | 1 |
| 5 | $\frac{(-12) \times (+49)}{(-18) \times (-35)} =$ کسر را ساده کنید. | 1 |


| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|-----------------|----------------|----------------|------------|--|--|--|--|--|
| 1 | $\left(\frac{2}{5}\right) - 3 =$ | حاصل عبارت را با رسم محور بیابید. | 6 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | $-\frac{2}{9}, -\frac{7}{5}, 0, 3\frac{2}{7}$ | اعداد را در جدول در جای مناسب قرار دهید. | 7 | | | | | | | | |
| | | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>$-1 \leq x < 0$</td> <td>$0 \leq x < 1$</td> <td>$1 \leq x < 2$</td> <td>$x \geq 2$</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> | $-1 \leq x < 0$ | $0 \leq x < 1$ | $1 \leq x < 2$ | $x \geq 2$ | | | | | |
| $-1 \leq x < 0$ | $0 \leq x < 1$ | $1 \leq x < 2$ | $x \geq 2$ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | | الف) دو تا عدد اول بین اعداد 30 و 40 بنویسید. ب) آیا عدد 119 اول است؟ چرا؟ | 8 | | | | | | | | |
| 1 | | برای تعیین اعداد اول کمتر از 140 حداقل چند تا تقسیم لازم هست؟ توضیح دهید. | 9 | | | | | | | | |
| 1 | | با توجه به شکل و اطلاعات داده شده زوایای تعیین شده را بیابید. | 10 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-----|--|---|----|
| 0.5 | $\begin{cases} x \perp a \\ a \parallel b \end{cases} \rightarrow \dots$ | برای سه خط راست a, b, x با رسم شکل نتیجه عبارت زیر را بنویسید. | 11 |
| 1 | $(a \parallel b)$  | در متوازی الاضلاع داده شده مقدار مجهول را بیابید. | 12 |
| 1 | | $\begin{array}{c} 3x - 4 \\ \hline 2x + 6 \end{array}$ | |
| 1.5 | $2(x - 3y) + 5y =$ $b)$ برای مستطیلی با ابعاد a و b مساحت آن را با یک عبارت جبری بنویسید. | $a)$ عبارت جبری را ساده نمایید. $b)$ مجموع زوایای داخلی یک دوازده ضلعی را محاسبه نمایید. $b)$ اندازه هر زاویه خارجی یک هشت ضلعی منتظم چند درجه است؟ | 13 |
| 1 | $6x^4y^3 - 12x^5y^2 =$ $b)$ $\frac{3}{5}x^5 - \frac{3}{5}x^4z =$ | عبارات داده شده را تجزیه نمایید. | 14 |
| 1.5 | $a)$ $\frac{2}{3} + \frac{x+1}{2} = \frac{1}{3}$ $b)$ $4x - 3 = 2x - 1 + 5x$ | معادلات جبری را حل نمایید. | 15 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----|----|---|---|-----|--|--|--|--|
| 1 | $y = 3x - 2$ با توجه به رابطه x و y ، جدول زیر را کامل نمایید. | 17 | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">x</td><td style="text-align: center;">-1</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">y</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> | x | -1 | 0 | 4 | y | | | | |
| x | -1 | 0 | 4 | | | | | | | |
| y | | | | | | | | | | |
| 1 | با توجه به شکل داده شده، مختصات بردار C را بیابید (نوشتن مختصات بردارها و راه حل لازم است) $\vec{C} = 3\vec{a} + 2\vec{b} = []$ | 18 | | | | | | | | |



| | | |
|-----|--|----|
| 1.5 | معادلات مختصاتی را حل نمایید. (الف) $\begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ (ب) $\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} + X = \begin{bmatrix} -4 \\ 6 \end{bmatrix}$ | 19 |
|-----|--|----|



تاریخ امتحان: 17/10/1401

باسم‌هه تعالی

ساعت شروع: 10 صبح

وزارت آموزش و پرورش

نام: ..

مدت ارزشیابی: 120 دقیقه

اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

نام خانوادگی:

دی ماه سال تحصیلی 1401-1402

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دزفول

نام پدر: ..


تعداد 3 صفحه


نام آموزشگاه: متوسطه اول حجاب

شماره: ..

دبیر: تکریمی

درس ریاضی پایه هشتم

| ردیف | | بارم |
|--------------------|--|---|
| پاسخ تشریحی | | |
| 1 | | الف) غلط ب) غلط ج) دست د) درست |
| 2 | | الف) صفر ب) 2 ج) $\vec{t} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ د) 360 درجه |
| 3 | | الف) 1 ب) 3 ج) 1 د) 4 |
| 4 | | الف) $4 - (3 - (1 - 5)) = 4 - (3 - (-4)) = 4 - (3 + 4) = 4 - 7 = -3$ ب) $(-8 + 15 + 3) \div (-2) = 10 \div (-2) = -5$ |
| 5 | | $\frac{(-12) \times (+49)}{(-18) \times (-35)} = (-3 \times 4 \times 7 \times 7) / (+3 \times 6 \times 7 \times 5) = -\frac{2 \times 2 \times 7}{2 \times 3 \times 5} = -\frac{14}{15}$ |
| 6 | | $\left(\frac{2}{5}\right) - 3 = -2\frac{3}{5}$  |
| 7 | | $\begin{cases} -1 \leq x < 0 \rightarrow -\frac{2}{9} \\ 0 \leq x < 1 \rightarrow 0 \\ 1 \leq x < 2 \rightarrow \text{نداریم} \\ 2 \leq x \rightarrow 3\frac{2}{7} \end{cases}$ |

| | | |
|--|--|----|
| | <p>الف) 37 ، 31 ب) خیر زیرا 119 بر 7 بخشپذیر است.</p> | 8 |
| | <p>$\sqrt{140} \approx 11 / 8$ $2,3,5,7,11$ اعداد اول قبل از جذر 140 عبارتند از: لذا برای تعیین اعداد اول کمتر از 140، حداقل 5 تا تقسیم لازم هست.</p> | 9 |
| | $\begin{cases} \widehat{C_1} = 48^\circ \\ \widehat{A} = 82^\circ \\ \widehat{D_1} = 112^\circ \\ \widehat{B_1} = 26^\circ \end{cases}$ | 10 |
| | $\left\{ \begin{array}{l} x \perp a \\ a \parallel b \end{array} \right. \rightarrow x \perp b$  | 11 |
| | <p>در متوازی الاضلاع داریم:</p> $3x - 4 = 2x + 6 \rightarrow 3x - 2x = 6 + 4 \rightarrow x = 10$ <p>در شکل بعدی که 2تا خط موازی و یک مورب دارد:</p> $x = 180 - 135 = 45$ | 12 |
| | $n = 12 \rightarrow (n - 2) \times 180 = (12 - 2) \times 180 = 10 \times 180 = 1800$ الف) | 13 |
| | $n = 8 \rightarrow \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{8} = 45^\circ$ ب) | |
| | $2(x - 3y) + 5y = 2x - 6y + 5y = 2x - y$ الف) | |
| | $S = a \times b = ab$ ب) با توجه به فرمول مساحت مستطیل داریم: | 14 |
| | <p>الف) $6x^4y^3 - 12x^5y^2 = 6x^4y^2(y - 2x)$</p> <p>ب) $\frac{3}{5}x^5 - \frac{3}{5}x^4z = \frac{3}{5}x^4(x - z)$</p> | 15 |

| | | |
|--|--|----|
| | $\frac{2}{3} + \frac{x+1}{2} = \frac{1}{3} \xrightarrow{\times 6} 4 + 3(x+1) = 2$ $\rightarrow 4 + 3x + 3 = 2 \rightarrow 3x = 2 - 4 - 3$ $\rightarrow 3x = -5 \rightarrow x = -\frac{5}{3}$ <p>(الف)</p> $4x - 3 = 2x - 1 + 5x$ $4x - 2x - 5x = -1 + 3 \rightarrow -3x = 2 \rightarrow x = \frac{2}{-3}$ <p>(ب)</p> | 16 |
| | $y = 3x - 2 \rightarrow \begin{cases} x = -1 \rightarrow y = 3(-1) - 2 = -3 - 2 = -5 \\ x = 0 \rightarrow y = 3(0) - 2 = -2 \\ x = 4 \rightarrow y = 3(4) - 2 = 12 - 2 = 10 \end{cases}$ | 17 |
| | $\begin{cases} \vec{a} = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix} \rightarrow 3a = \begin{bmatrix} -6 \\ -3 \end{bmatrix} \\ \vec{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} \rightarrow 2b = \begin{bmatrix} 6 \\ -2 \end{bmatrix} \end{cases} \rightarrow$ $C = 3a + 2b = \begin{bmatrix} -6 \\ -3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -5 \end{bmatrix}$ | 18 |
| | $\begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ $\begin{cases} 5 + x = 2 \rightarrow x = 2 - 5 \rightarrow x = -3 \\ 6 + y = -1 \rightarrow y = -1 - 6 \rightarrow y = -7 \end{cases}$ <p>(الف)</p> $\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} + X = \begin{bmatrix} -4 \\ 6 \end{bmatrix}$ $X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 6 \end{bmatrix}$ $\begin{cases} 2 + x = -4 \rightarrow x = -4 - 2 \rightarrow x = -6 \\ 5 + y = 6 \rightarrow y = 6 - 5 \rightarrow y = 1 \end{cases}$ <p>(ب)</p> | 19 |

